

CATALOG FURAJE



Pui | Găini | Curci | Prepelițe | Rațe | Gâște | Porci | Iepuri



VITALINE

**Furaj complet cu 22,5% proteină
pentru o creștere susținută a puilor de carne**

PROFESIONAL*



Brizură pentru puii cu vârsta între 1-30 de zile

*Inclusiv în sistem de creștere intensiv

CUPRINS

VITALINE SUPER PREMIUM FURAJ COMPLET PENTRU PUI

START - CREȘTERE3

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLET PUI

START - CREȘTERE4

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLEMENTAR PUI CPVM A1-40

START - CREȘTERE5

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLEMENTAR PUI CPVM A2-35

CREȘTERE - FINISARE6

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLEMENTAR GĂINI CPVM A5-40

GĂINI OUĂTOARE7

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLEMENTAR PORCI CPVM P1+P2

START - CREȘTERE8

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLEMENTAR PORCI CPVM P3+P4

CREȘTERE - FINISARE9

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLET PREPELIȚE

CREȘTERE10

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLET PREPELIȚE

PERIOADA DE OUAT11

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLET PUI START

CREȘTERE12

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLET PUI DE CURCĂ

START13

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLET GĂINI

GĂINI - OUĂTOARE14

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLET PUI

CREȘTERE - FINISARE15

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLET PUI DE CURCĂ

CREȘTERE16

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLET RAȚE - GÂȘTE

CREȘTERE17

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLET PENTRU PORCI

START - CREȘTERE18

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLEMENTAR PENTRU IEPURI

IEPURI LA ÎNGRĂȘARE19

FURAJ COMPLEMENTAR PENTRU MIEI

FAZĂ 120

FURAJ COMPLEMENTAR PENTRU MIEI

FAZĂ 221

FURAJ COMPLEMENTAR PENTRU VIȚEI

FAZĂ 122

FURAJ COMPLEMENTAR PENTRU VIȚEI

FAZĂ 223

FURAJ COMPLEMENTAR PENTRU VIȚEI

FAZĂ 324

FURAJ COMPLET PENTRU PUI STARTER

RURAL25

FURAJ COMPLET PENTRU PUI CURCĂ

START RURAL26


FURAJ COMPLET PENTRU PUI

CREȘTERE/ FINISARE RURAL27


FURAJ COMPLET PENTRU PUI CURCĂ

CREȘTERE RURAL28


Vitaline Super Premium




Vitaline Făinos (Pulbere)



Vitaline Brizurat



Vitaline Granulat



Rural furaj Complet Brizurat



Rural furaj Complet Granulat



*Acest produs conține organisme modificate genetic.

VITALINE SUPER PREMIUM FURAJ COMPLET PENTRU PUI START - CREȘTERE

Mod de utilizare: se administrează la puii de carne între 1-30 zile, având apă la discreție.

Compoziție: porumb, șrot de soia (OMG*), tărâță de grâu, gluten din porumb, ulei din floarea soarelui, carbonat de calciu, fosfat monocalcic, sare.

Atenționări: A nu se amesteca cu alte coccidiostatice sau produse care conțin coccidiostatice! Periculos pentru cabaline. Acest furaj conține un ionofor: evitați administrarea simultană cu tiamulin și monitorizați eventualele reacții adverse atunci când este utilizat concomitent cu alte substanțe medicamentoase. Trebuie evitată utilizarea simultană cu apă de băut în care s-a adăugat clorură de colină. Utilizarea simultană a diferiților acizi organici sau a sărurilor acestora este contraindicată în cazul în care unul sau mai mulți dintre aceștia sunt utilizați într-o cantitate corespunzătoare conținutului maxim permis sau apropiată de acesta. **Interzis la rumegătoare.**

Perioada de așteptare la carne: a nu se folosi cu cel puțin 3 zile înainte de sacrificare.

A SE PĂSTRA LA LOC USCAT ȘI RĂCOROS.



Valori nutriționale		Umiditate	%	9.91
		Proteine brute	%	22.5
		Grăsimi brute	%	4.97
		Fibre brute	%	3.81
		Cenușă brută	%	6.98
		Fosfor	%	0.83
		Calciu	%	0.88
		Lizină	%	1.52
		Metionină	%	0.54
		Sodiu	%	0.16
Aditivi nutriționali				
Vitamine	3a672a	Vitamina A	UI/Kg	10000
	3a671	Vitamina D3	UI/Kg	4500
	3a700i	Vitamina E	mg/Kg	65
	3a711	Vitamina K (ca MNB)	mg/Kg	3
	3a821	Vitamina B1 (ca mononitrat de tiamină)	mg/Kg	2.5
	3a825ii	Vitamina B2	mg/Kg	6.5
	3a841	D-pantotenat de calciu	mg/Kg	18
	3a831	Vitamina B6	mg/Kg	3.2
	3a835	Vitamina B12	mg/Kg	0.017
	3a314	Niacina	mg/Kg	60
	3a316	Acid folic	mg/Kg	1.9
	3a880	Biotină	mg/Kg	0.18
	3a890	Clorură de colină	mg/Kg	200
	3a920	Betaină	mg/Kg	182.5
Minerale	3b103	Fier (Sulfat de fier (II) monohidrat)	mg/Kg	20
	3b405	Cupru (Sulfat de cupru (II) pentahidrat)	mg/Kg	16
	3b502	Mangan (oxid (II) manganos)	mg/Kg	120
	3b603	Zinc (oxid de zinc)	mg/Kg	110
	3b203	Iod (iodat de calciu anhidru granulat învelit)	mg/Kg	1.25
	3b802	Seleniu (selenit de sodiu granulat învelit)	mg/Kg	0.3
Aminoacizi	3c301	DL- metionină	mg/Kg	1980
	3c322	L-lizină (clorhidrat)	mg/Kg	3120
Aditivi zootehnici				
Promotori de digestibilitate	4a1602i	Endo-1, 4-beta glucanază EC 3.2.1.4	U/kg	32
	4a1602i	Endo-1, 3-beta glucanază EC 3.2.1.6	U/kg	28
	4a1602i	Endo-1, 4-beta xilanază EC 3.2.1.8	U/kg	108
	4a18i	6 - Fitază (EC 3.1.3.26)	FYT/kg	1000
Coccidiostatice și histomonostatice				
Coccidiostatic	5 1 701	Coxidin (monensin sodic)	mg/kg	100
Aditivi tehnologici				
Antioxidanți	E321	BHT	mg/Kg	0.70
	E310	Propil galat	mg/Kg	0.06
Conservanți	1a330	Acid citric	mg/Kg	35.00
Antiaglomeranți	E551a	Acid silicic	mg/Kg	15.27

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLET PUI START - CREȘTERE

Mod de utilizare: se administrează la puii de carne între 1-30 zile, având apă la discreție.

Compoziție: făină de porumb, tărâță de grâu, șrot de soia (OMG*), șrot de floarea soarelui, gluten din porumb, orz, carbonat de calciu, ulei din floarea soarelui, fosfat monocalcic, sare.

Atenționări: A nu se amesteca cu alte coccidiostatice sau produse care conțin coccidiostatice! Periculos pentru cabaline. Acest furaj conține un ionofor: evitați administrarea simultană cu tiamulin și monitorizați eventualele reacții adverse atunci când este utilizat concomitent cu alte substanțe medicamentoase. Trebuie evitată utilizarea simultană cu apă de băut în care sa adăugat clorură de colină. Utilizarea simultană a diferiților acizi organici sau a sărurilor acestora este contraindicată în cazul în care unul sau mai mulți dintre aceștia sunt utilizați într-o cantitate corespunzătoare conținutului maxim permis sau apropiată de acesta. **Interzis la rumegătoare.**

Perioada de așteptare la carne: a nu se folosi cu cel puțin 3 zile înainte de sacrificare.

A SE PĂSTRA LA LOC USCAT ȘI RĂCOROS.



Valori nutriționale		Umiditate	%	12
		Proteine brute	%	20
		Grăsimi brute	%	3.99
		Fibre brute	%	6.98
		Cenușă brută	%	8.68
		Fosfor	%	0.8
		Calciu	%	0.85
		Lizină	%	0.89
		Metionină	%	0.36
		Sodiu	%	0.16
Aditivi nutriționali				
Vitamine	3a672a	Vitamina A	UI/Kg	10000
	3a671	Vitamina D3	UI/Kg	4500
	3a700i	Vitamina E	mg/Kg	65
	3a711	Vitamina K (ca MNB)	mg/Kg	3
	3a821	Vitamina B1 (ca mononitrat de tiamină)	mg/Kg	2.5
	3a825ii	Vitamina B2	mg/Kg	6.5
	3a841	D-pantotenat de calciu	mg/Kg	18
	3a831	Vitamina B6	mg/Kg	3.2
	3a835	Vitamina B12	mg/Kg	0.017
	3a314	Niacina	mg/Kg	60
	3a316	Acid folic	mg/Kg	1.9
	3a880	Biotină	mg/Kg	0.18
	3a890	Clorură de colină	mg/Kg	200
	3a920	Betaină	mg/Kg	182.5
Minerale	3b103	Fier (Sulfat de fier (II) monohidrat)	mg/Kg	20
	3b405	Cupru (Sulfat de cupru (II) pentahidrat)	mg/Kg	16
	3b502	Mangan (oxid (II) manganos)	mg/Kg	120
	3b603	Zinc (oxid de zinc)	mg/Kg	110
	3b203	Iod (iodat de calciu anhidru granulat învelit)	mg/Kg	1.25
	3b802	Seleniu (selenit de sodiu granulat învelit)	mg/Kg	0.3
Aditivi zootehnici				
Promotori de digestibilitate	4a1602i	Endo-1, 4-beta glucanază EC 3.2.1.4	U/kg	32
	4a1602i	Endo-1, 3-beta glucanază EC 3.2.1.6	U/kg	28
	4a1602i	Endo-1, 4-beta xilanază EC 3.2.1.8	U/kg	108
	4a18i	6 - Fitază (EC 3.1.3.26)	FYT/kg	1000
Coccidiostatice și histomonostatice				
Coccidiostatic	5 1 701	Coxidin (monensin sodic)	mg/kg	100
Aditivi tehnologici				
Antioxidanți	E321	BHT	mg/Kg	0.70
	E310	Propil galat	mg/Kg	0.06
Conservanți	1a330	Acid citric	mg/Kg	35.00
Antiglomeranți	E551a	Acid silicic	mg/Kg	15.27

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLEMENTAR PUI CPVM A1-40 - START - CREȘTERE

Mod de utilizare: se administrează în amestec cu cereale (40% CPVM: 60% cereale) la puii de carne, în perioada de start- creștere.

Compoziție: șrot de soia (OMG*), șrot de floarea soarelui, carbonat de calciu, gluten din porumb, fosfat monocalcic, ulei din floarea soarelui, sare.

Atenționări: A nu se amesteca cu alte coccidiostatice sau produse care conțin coccidiostatice! Periculos pentru cabaline. Acest furaj conține un ionofor: evitați administrarea simultană cu tiamulin și monitorizați eventualele reacții adverse atunci când este utilizat concomitent cu alte substanțe medicamentoase. Trebuie evitată utilizarea simultană cu apă de băut în care s-a adăugat clorură de colină. Utilizarea simultană a diferiților acizi organici sau a sărurilor acestora este contraindicată în cazul în care unul sau mai mulți dintre aceștia sunt utilizați într-o cantitate corespunzătoare conținutului maxim permis sau apropiată de acesta. **Interzis la rumegătoare.**

Perioada de așteptare la carne: a nu se folosi cu cel puțin 3 zile înainte de sacrificare.

A SE PĂSTRA LA LOC USCAT ȘI RĂCOROS.



Valori nutriționale		Umiditate	%	12
		Proteine brute	%	38
		Grăsimi brute	%	1.99
		Fibre brute	%	7.87
		Cenușă brută	%	9.4
		Fosfor	%	1
		Calciu	%	3
		Lizină	%	1.19
		Metionină	%	0.84
		Sodiu	%	0.45
Aditivi nutriționali				
Vitamine	3a672a	Vitamina A	UI/Kg	25000
	3a671	Vitamina D3	UI/Kg	11250
	3a700i	Vitamina E	mg/Kg	162.5
	3a711	Vitamina K (ca MNB)	mg/Kg	7.5
	3a821	Vitamina B1 (ca mononitrat de tiamina)	mg/Kg	6.25
	3a825ii	Vitamina B2	mg/Kg	16.25
	3a841	D-pantotenat de calciu	mg/Kg	45
	3a831	Vitamina B6	mg/Kg	8
	3a835	Vitamina B12	mg/Kg	0.0425
	3a314	Niacina	mg/Kg	150
	3a316	Acid folic	mg/Kg	4.75
	3a880	Biotină	mg/Kg	0.45
	3a890	Clorură de colină	mg/Kg	500
	3a920	Betaină	mg/Kg	456.25
Minerale	3b103	Fier (Sulfat de fier (II) monohidrat)	mg/Kg	50
	3b405	Cupru (Sulfat de cupru (II) pentahidrat)	mg/Kg	40
	3b502	Mangan (oxid (II) manganos)	mg/Kg	300
	3b603	Zinc (oxid de zinc)	mg/Kg	275
	3b203	Iod (iodat de calciu anhidru granulat învelit)	mg/Kg	3.125
	3b802	Seleniu (selenit de sodiu granulat învelit)	mg/Kg	0.75
Aditivi zootehnici				
Promotori de digestibilitate	4a1602i	Endo-1, 4-beta glucanază EC 3.2.1.4	U/kg	80
	4a1602i	Endo-1, 3-beta glucanază EC 3.2.1.6	U/kg	70
	4a1602i	Endo-1, 4-beta xilanază EC 3.2.1.8	U/kg	270
	4a18i	6 - Fitază (EC 3.1.3.26)	FYT/kg	2500
Coccidiostatice și histomonostatice				
Coccidiostatic	5 1 701	Coxidin (monensin sodic)	mg/Kg	260
Aditivi tehnologici				
Antioxidanți	E321	BHT	mg/Kg	1.76
	E310	Propil galat	mg/Kg	0.14
Conservanți	1a330	Acid citric	mg/Kg	0.44
Antiaglomeranți	E551a	Acid silicic	mg/Kg	38.18

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLEMENTAR PUI CPVM A2-35 - CREȘTERE - FINISARE

Mod de utilizare: se administrează în amestec cu cereale (35% CPVM: 65% cereale) la puii de carne, în perioada de creștere - finisare.

Compoziție: șrot de soia (OMG*), șrot de floarea soarelui, carbonat de calciu, fosfat monocalcic, ulei din floarea soarelui, sare.

Atenționări: A nu se amesteca cu alte coccidiostatice sau produse care conțin coccidiostatice! Periculos pentru cabaline. Acest furaj conține un ionofor: evitați administrarea simultană cu tiamulin și monitorizați eventualele reacții adverse atunci când este utilizat concomitent cu alte substanțe medicamentoase. Trebuie evitată utilizarea simultană cu apă de băut în care s-a adăugat clorură de colină. Utilizarea simultană a diferiților acizi organici sau a sărurilor acestora este contraindicată în cazul în care unul sau mai mulți dintre aceștia sunt utilizați într-o cantitate corespunzătoare conținutului maxim permis sau apropiată de acesta. **Interzis la rumegătoare.**

Perioada de așteptare la carne: a nu se folosi cu cel puțin 3 zile înainte de sacrificare.

A SE PĂSTRA LA LOC USCAT ȘI RĂCOROS.



Valori nutriționale		Umiditate	%	9.62
		Proteine brute	%	37.53
		Grăsimi brute	%	2.47
		Fibre brute	%	6.64
		Cenușă brută	%	15.61
		Fosfor	%	1.52
		Calciu	%	2.69
		Lizină	%	2.19
		Metionină	%	0.59
		Sodiu	%	0.44
Aditivi nutriționali				
Vitamine	3a672a	Vitamina A	UI/Kg	28000
	3a671	Vitamina D3	UI/Kg	12600
	3a700i	Vitamina E	mg/Kg	182
	3a711	Vitamina K (ca MNB)	mg/Kg	8.4
	3a821	Vitamina B1 (ca mononitrat de tiamină)	mg/Kg	7
	3a825ii	Vitamina B2	mg/Kg	18.2
	3a841	D-pantotenat de calciu	mg/Kg	50.4
	3a831	Vitamina B6	mg/Kg	8.96
	3a835	Vitamina B12	mg/Kg	0.0476
	3a314	Niacina	mg/Kg	168
	3a316	Acid folic	mg/Kg	5.3
	3a880	Biotină	mg/Kg	0.504
	3a890	Clorură de colină	mg/Kg	560
	3a920	Betaină	mg/Kg	511
Minerale	3b103	Fier (Sulfat de fier (II) monohidrat)	mg/Kg	56
	3b405	Cupru (Sulfat de cupru (II) pentahidrat)	mg/Kg	44.8
	3b502	Mangan (oxid (II) manganos)	mg/Kg	336
	3b603	Zinc (oxid de zinc)	mg/Kg	308
	3b203	Iod (iodat de calciu anhidru granulat învelit)	mg/Kg	3.5
	3b802	Seleniu (selenit de sodiu granulat învelit)	mg/Kg	0.84
Aditivi zootehnici				
Promotori de digestibilitate	4a1602i	Endo-1, 4-beta glucanază EC 3.2.1.4	U/kg	90
	4a1602i	Endo-1, 3-beta glucanază EC 3.2.1.6	U/kg	78
	4a1602i	Endo-1, 4-beta xilanază EC 3.2.1.8	U/kg	302
	4a18i	6 - Fitază (EC 3.1.3.26)	FYT/kg	2800
Coccidiostatice și histomonostatice				
Coccidiostatic	5 1 701	Coxidin (monensin sodic)	mg/Kg	300
Aditivi tehnologici				
Antioxidanți	E321	BHT	mg/Kg	1.97
	E310	Propil galat	mg/Kg	0.16
Conservanți	1a330	Acid citric	mg/Kg	0.49
Antiaglomeranți	E551a	Acid silicic	mg/Kg	42.77

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLEMENTAR GĂINI CPVM A5-40 - GĂINI OUĂTOARE

Mod de utilizare: se administrează în amestec cu cereale (40% CPVM: 60% cereale) la găini ouătoare, pe toată perioada de exploatare.

Compoziție: șrot de soia (OMG*), carbonat de calciu, șrot de floarea soarelui, fosfat monocalcic, sare, ulei din floarea soarelui.

Atenționări: A se evita utilizarea simultană cu apa de băut în care a fost adăugată clorură de colină. Utilizarea simultană a diferiților acizi organici sau a sărurilor acestora este contraindicată în cazul în care unul sau mai mulți dintre aceștia sunt utilizați într-o cantitate corespunzătoare conținutului maxim permis sau apropiată de acesta. **Interzis la rumegătoare.**

A SE PĂSTRA LA LOC USCAT ȘI RĂCOROS.



Valori nutriționale		Umiditate	%	7.42
		Proteine brute	%	28
		Grăsimi brute	%	1.26
		Fibre brute	%	5.1
		Cenușă brută	%	35.8
		Fosfor	%	1.67
		Calciu	%	11.25
		Lizină	%	1.59
		Metionină	%	0.46
		Sodiu	%	0.45
Aditivi nutriționali				
Vitamine	3a672a	Vitamina A	UI/Kg	20000
	3a671	Vitamina D3	UI/Kg	5000
	3a700i	Vitamina E	mg/Kg	37.5
	3a711	Vitamina K (ca MNB)	mg/Kg	5
	3a821	Vitamina B1 (ca mononitrat de tiamină)	mg/Kg	3.75
	3a825ii	Vitamina B2	mg/Kg	10
	3a841	D-pantotenat de calciu	mg/Kg	20
	3a831	Vitamina B6	mg/Kg	7.5
	3a835	Vitamina B12	mg/Kg	0.0375
	3a314	Niacina	mg/Kg	50
	3a880	Biotină	mg/Kg	0.0625
3a890	Clorură de colină	mg/Kg	1000	
Minerale	3b405	Cupru (Sulfat de cupru (II) pentahidrat)	mg/Kg	12.5
	3b502	Mangan (oxid (II) manganos)	mg/Kg	175
	3b603	Zinc (oxid de zinc)	mg/Kg	125
	3b203	Iod (iodat de calciu anhidru granulat învelit)	mg/Kg	2
	3b802	Seleniu (selenit de sodiu granulat învelit)	mg/Kg	0.5
Aditivi tehnologici				
Antioxidanți	E321	BHT	mg/Kg	1.76
	E310	Propil galat	mg/Kg	0.15
Conservanți	1a330	Acid citric	mg/Kg	0.44
Antiaglomeranți	E551a	Acid silicic	mg/Kg	37.60

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLEMENTAR PORCI CPVM P1+P2 - START - CREȘTERE

Mod de utilizare: se administrează în amestec cu cereale (35% CPVM: 65% cereale) la porci la îngrășat, în perioada de start - creștere.

Compoziție: șrot de floarea soarelui, șrot de soia (OMG*), carbonat de calciu, fosfat monocalcic, ulei din floare soarelui, sare.

Atenționări: Poate produce reacții alergice. A se evita utilizarea simultană cu apa de băut în care a fost adăugată clorură de colină. Utilizarea simultană a diferiților acizi organici sau a sărurilor acestora este contraindicată în cazul în care unul sau mai mulți dintre aceștia sunt utilizați într-o cantitate corespunzătoare conținutului maxim permis sau apropiată de acesta. **Interzis la rumegătoare.**

A SE PĂSTRA LA LOC USCAT ȘI RĂCOROS.



Valori nutriționale		Umiditate	%	9.33
		Proteine brute	%	34
		Grăsimi brute	%	2.52
		Fibre brute	%	12.79
		Cenușă brută	%	12.96
		Fosfor	%	1.48
		Calciu	%	2.46
		Lizină	%	1.82
		Metionină	%	0.65
		Sodiu	%	0.37
Aditivi nutriționali				
Vitamine	3a672a	Vitamina A	UI/kg	26000
	3a671	Vitamina D3	UI/kg	8000
	3a700i	Vitamina E	mg/kg	240
	3a711	Vitamina K (ca MNB)	mg/kg	6
	3a821	Vitamina B1 (ca mononitrat de tiamină)	mg/kg	6
	3a825ii	Vitamina B2	mg/kg	14
	3a841	D-pantotenat de calciu	mg/kg	50
	3a831	Vitamina B6	mg/kg	6
	3a835	Vitamina B12	mg/kg	0.1
	3a314	Niacina	mg/kg	80
	3a880	Biotină	mg/kg	0.1
	3a890	Clorură de colină	mg/kg	360
Minerale	3b103	Fier (Sulfat de fier (II) monohidrat)	mg/Kg	300
	3b405	Cupru (Sulfat de cupru (II) pentahidrat)	mg/Kg	60
	3b502	Mangan (oxid (II) manganos)	mg/Kg	140
	3b603	Zinc (oxid de zinc)	mg/Kg	340
	3b203	Iod (iodat de calciu anhidru granulat învelit)	mg/Kg	5
	3b802	Seleniu (selenit de sodiu granulat învelit)	mg/Kg	1
Aminoacizi	3c322	L-lizină (clorhidrat)	mg/Kg	2340
Aditivi zootehnici				
Promotori de digestibilitate	4a18i	6 - Fitază (EC 3.1.3.26)	FYT/kg	3000
Aditivi tehnologici				
Antioxidanți	E321	BHT	mg/Kg	2.81
	E310	Propil galat	mg/Kg	0.23
Conservanți	1a330	Acid citric	mg/Kg	0.7
Antiaglomeranți	E551a	Acid silicic	mg/Kg	60.28
PRODUSUL NU CONTINE FĂINURI DE ORIGINE ANIMALĂ				

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLEMENTAR PORCI CPVM P3+P4 - CREȘTERE - FINISARE

Mod de utilizare: se administrează în amestec cu cereale (25% CPVM: 75% cereale) la porci la îngrășat, în perioada de creștere-finisare.

Compoziție: șrot de floarea soarelui, tărâță de grâu, gluten, șrot de soia (OMG*), carbonat de calciu, fosfat monocalcic, ulei din floarea soarelui, sare.

Atenționări: Poate produce reacții alergice. A se evita utilizarea simultană cu apa de băut în care a fost adăugată clorură de colină. Utilizarea simultană a diferiților acizi organici sau a sărurilor acestora este contraindicată în cazul în care unul sau mai mulți dintre aceștia sunt utilizați într-o cantitate corespunzătoare conținutului maxim permis sau apropiată de acesta. **Interzis la rumegătoare.**

A SE PĂSTRA LA LOC USCAT ȘI RĂCOROS.



Valori nutriționale		Umiditate	%	9.69
		Proteine brute	%	27
		Grăsimi brute	%	3.5
		Fibre brute	%	9.21
		Cenușă brută	%	14.21
		Fosfor	%	1.37
		Calciu	%	2.97
		Lizină	%	1.33
		Metionină	%	0.48
		Sodiu	%	0.42
Aditivi nutriționali				
Vitamine	3a672a	Vitamina A	UI/kg	18590
	3a671	Vitamina D3	UI/kg	5720
	3a700i	Vitamina E	mg/kg	171.6
	3a711	Vitamina K (ca MNB)	mg/kg	4.29
	3a821	Vitamina B1 (ca mononitrat de tiamină)	mg/kg	4.29
	3a825ii	Vitamina B2	mg/kg	10.01
	3a841	D-pantotenat de calciu	mg/kg	35.75
	3a831	Vitamina B6	mg/kg	4.29
	3a835	Vitamina B12	mg/kg	0.0715
	3a314	Niacina	mg/kg	57.2
	3a880	Biotină	mg/kg	0.0715
	3a890	Clorură de colină	mg/kg	257.4
Minerale	3b103	Fier (Sulfat de fier (II) monohidrat)	mg/Kg	214.5
	3b405	Cupru (Sulfat de cupru (II) pentahidrat)	mg/Kg	42.9
	3b502	Mangan (oxid (II) manganos)	mg/Kg	100.1
	3b603	Zinc (oxid de zinc)	mg/Kg	243.1
	3b203	Iod (iodat de calciu anhidru granulat învelit)	mg/Kg	3.575
	3b802	Seleniu (selenit de sodiu granulat învelit)	mg/Kg	0.715
Aditivi zootehnici				
Promotori de digestibilitate	4a18i	6 - Fitază (EC 3.1.3.26)	FYT/kg	2145
Aditivi tehnologici				
Antioxidanți	E321	BHT	mg/Kg	2.01
	E310	Propil galat	mg/Kg	0.17
Conservanți	1a330	Acid citric	mg/Kg	0.7
Antiaglomeranți	E551a	Acid silicic	mg/Kg	43.10
PRODUSUL NU CONTINE FĂINURI DE ORIGINE ANIMALĂ				

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLET PREPELIȚE - CREȘTERE

Mod de utilizare: se administrează la puii de prepeliță în perioada de creștere, având apă la discreție.

Compoziție: porumb, porumb mălai, șrot de soia (OMG*), gluten din porumb, șrot de floarea soarelui, carbonat de calciu, fosfat monocalcic, sare.

Atenționări: Trebuie evitată utilizarea simultană cu apă de băut în care s-a adăugat clorură de colină. Utilizarea simultană a acizilor organici sau a sărurilor acestora este contraindicată în cazul în care unul sau mai mulți dintre aceștia sunt utilizați într-o cantitate corespunzătoare conținutului maxim permis sau apropiată de acesta. **Interzis la rumegătoare.**

A SE PĂSTRA LA LOC USCAT ȘI RĂCOROS.



Valori nutriționale		Umiditate	%	12
		Proteina bruta	%	21.5
		Grasime bruta	%	2.1
		Celuloza bruta	%	4.5
		Cenusa bruta	%	4
		Fosfor	%	0.75
		Calciu	%	1.05
		Lizina	%	0.95
		Metionina	%	0.5
		Sodiu	%	0.17
Aditivi nutriționali				
Vitamine	3a672a	Vitamina A	UI/Kg	10000
	3a671	Vitamina D3	UI/Kg	4500
	3a700i	Vitamina E	mg/Kg	65
	3a711	Vitamina K (ca MNB)	mg/Kg	3
	3a821	Vitamina B1 (ca mononitrat de tiamină)	mg/Kg	2.5
	3a825ii	Vitamina B2	mg/Kg	6.5
	3a841	D-pantotenat de calciu	mg/Kg	18
	3a831	Vitamina B6	mg/Kg	3.2
	3a835	Vitamina B12	mg/Kg	0.02
	3a314	Niacina	mg/Kg	60
	3a316	Acid folic	mg/Kg	1.9
	3a880	Biotină	mg/Kg	0.18
	3a890	Clorură de colină	mg/Kg	200
	3a920	Betaină	mg/Kg	182.5
Minerale	3b103	Fier (Sulfat de fier (II) monohidrat)	mcg/kg	20
	3b405	Cupru (Sulfat de cupru (II) pentahidrat)	mg/Kg	16
	3b502	Mangan (oxid (II) manganos)	mg/Kg	120
	3b603	Zinc (oxid de zinc)	mg/Kg	110
	3b203	Iod (iodat de calciu anhidru granulat învelit)	mg/Kg	1.25
	3b802	Seleniu (selenit de sodiu granulat învelit)	mg/Kg	0.3
Aditivi zootehnici				
Promotori de digestibilitate	4a1602i	Endo-1, 4-beta glucanază EC 3.2.1.4	U/kg	32
	4a1602i	Endo-1, 3-beta glucanază EC 3.2.1.6	U/kg	28
	4a1602i	Endo-1, 4-beta xilanază EC 3.2.1.8	U/kg	108
	4a18i	6 - Fitază (EC 3.1.3.26)	FYT/kg	1,000
Aditivi tehnologici				
Antioxidanți	E321	BHT	mg/Kg	0.7
	E310	Propil galat	mg/Kg	0.06
Conservanți	1a330	Acid citric	mg/Kg	0.18
Antiaglomeranți	E551a	Acid silicic	mg/Kg	15.27

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLET PREPELIȚE - PERIOADA DE OUAT

Mod de utilizare: se administrează prepelițelor adulte în perioada de ouat, având apă la discreție.

Compoziție: făină de porumb, șrot de floarea soarelui, șrot de soia (OMG*), radicele de orz, tărâță de grâu, carbonat de calciu, orz, ulei din floarea soarelui, fosfat monocalcic, sare.

Atenționări: A se evita utilizarea simultană cu apa de băut în care a fost adăugată clorură de colină. Utilizarea simultană a diferiților acizi organici sau a sărurilor acestora este contraindicată în cazul în care unul sau mai mulți dintre aceștia sunt utilizați într-o cantitate corespunzătoare conținutului maxim permis sau apropiată de acesta. **Interzis la rumegătoare.**

A SE PĂSTRA LA LOC USCAT ȘI RĂCOROS.



Valori nutriționale		Umiditate	%	10.92
		Proteine brute	%	18
		Grăsimi brute	%	3.48
		Fibre brute	%	6.5
		Cenușă brută	%	14.92
		Fosfor	%	0.68
		Calciu	%	3.38
		Lizină	%	0.77
		Metionină	%	0.34
		Sodiu	%	0.17
Aditivi nutriționali				
Vitamine	3a672a	Vitamina A	UI/Kg	8000
	3a671	Vitamina D3	UI/Kg	2000
	3a700i	Vitamina E	mg/Kg	15
	3a711	Vitamina K (ca MNB)	mg/Kg	2
	3a821	Vitamina B1 (ca mononitrat de tiamină)	mg/Kg	1.5
	3a825ii	Vitamina B2	mg/Kg	4
	3a841	D-pantotenat de calciu	mg/Kg	8
	3a831	Vitamina B6	mg/Kg	3
	3a835	Vitamina B12	mg/Kg	0.015
	3a314	Niacina	mg/Kg	20
	3a880	Biotină	mg/Kg	0.025
	3a890	Clorură de colină	mg/Kg	400
Minerale	3b405	Cupru (Sulfat de cupru (II) pentahidrat)	mg/Kg	5
	3b502	Mangan (oxid (II) manganos)	mg/Kg	70
	3b603	Zinc (oxid de zinc)	mg/Kg	50
	3b203	Iod (iodat de calciu anhidru granulat învelit)	mg/Kg	0.8
	3b802	Seleniu (selenit de sodiu granulat învelit)	mg/Kg	0.2
Aditivi tehnologici				
Antioxidanți	E321	BHT	mg/Kg	0.70
	E310	Propil galat	mg/Kg	0.06
Conservanți	1a330	Acid citric	mg/Kg	0.18
Antiaglomeranți	E551a	Acid silicic	mg/Kg	15.00

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLET PUI START - CREȘTERE

Mod de utilizare: se administrează la puii de carne între 1-30 zile, având apă la discreție.

Compoziție: făină de porumb, tărață de grâu, șrot de soia (OMG*), șrot de floarea soarelui, gluten din porumb, orz, carbonat de calciu, ulei din floarea soarelui, fosfat monocalcic, sare.

Atenționări: A nu se amesteca cu alte coccidiostatice sau produse care conțin coccidiostatice! Periculos pentru cabaline. Acest furaj conține un ionofor: evitați administrarea simultană cu tiamulin și monitorizați eventualele reacții adverse atunci când este utilizat concomitent cu alte substanțe medicamentoase. Trebuie evitată utilizarea simultană cu apă de băut în care s-a adăugat clorură de colină. Utilizarea simultană a diferiților acizi organici sau a sărurilor acestora este contraindicată în cazul în care unul sau mai mulți dintre aceștia sunt utilizați într-o cantitate corespunzătoare conținutului maxim permis sau apropiată de acesta. **Interzis la rumegătoare.**

Perioada de așteptare la carne: a nu se folosi cu cel puțin 3 zile înainte de sacrificare.

A SE PĂSTRA LA LOC USCAT ȘI RĂCOROS.



Valori nutriționale	Umiditate		%	12
	Proteine brute		%	20
	Grăsimi brute		%	3.99
	Fibre brute		%	6.98
	Cenușă brută		%	8.68
	Fosfor		%	0.8
	Calciu		%	0.85
	Lizină		%	0.89
	Metionină		%	0.36
	Sodiu		%	0.16
Aditivi nutriționali				
Vitamine	3a672a	Vitamina A	UI/Kg	10000
	3a671	Vitamina D3	UI/Kg	4500
	3a700i	Vitamina E	mg/Kg	65
	3a711	Vitamina K (ca MNB)	mg/Kg	3
	3a821	Vitamina B1 (ca mononitrat de tiamină)	mg/Kg	2.5
	3a825ii	Vitamina B2	mg/Kg	6.5
	3a841	D-pantotenat de calciu	mg/Kg	18
	3a831	Vitamina B6	mg/Kg	3.2
	3a835	Vitamina B12	mg/Kg	0.017
	3a314	Niacina	mg/Kg	60
	3a316	Acid folic	mg/Kg	1.9
	3a880	Biotină	mg/Kg	0.18
	3a890	Clorură de colină	mg/Kg	200
	3a920	Betaină	mg/Kg	182.5
Minerale	3b103	Fier (Sulfat de fier (II) monohidrat)	mg/Kg	20
	3b405	Cupru (Sulfat de cupru (II) pentahidrat)	mg/Kg	16
	3b502	Mangan (oxid (II) manganos)	mg/Kg	120
	3b603	Zinc (oxid de zinc)	mg/Kg	110
	3b203	Iod (iodat de calciu anhidru granulat învelit)	mg/Kg	1.25
	3b802	Seleniu (selenit de sodiu granulat învelit)	mg/Kg	0.3
Aditivi zootehnici				
Promotori de digestibilitate	4a1602i	Endo-1, 4-beta glucanază EC 3.2.1.4	U/kg	32
	4a1602i	Endo-1, 3-beta glucanază EC 3.2.1.6	U/kg	28
	4a1602i	Endo-1, 4-beta xilanază EC 3.2.1.8	U/kg	108
	4a18i	6 - Fitază (EC 3.1.3.26)	FYT/kg	1000
Coccidiostatice și histomonostatice				
Coccidiostatic	5 1 701	Coxidin (monensin sodic)	mg/kg	100
Aditivi tehnologici				
Antioxidanți	E321	BHT	mg/Kg	0.70
	E310	Propil galat	mg/Kg	0.06
Conservanți	1a330	Acid citric	mg/Kg	35.00
Antiaglomeranți	E551a	Acid silicic	mg/Kg	15.27

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLET PUI DE CURCĂ - START

Mod de utilizare: se administrează la puii de curcă între 1-30 zile, având apă la discreție.

Compoziție: șrot de soia (OMG*), gluten din porumb, orz, făină de porumb, tărâță de grâu, șrot de floarea soarelui, carbonat de calciu, fosfat monocalcic, ulei din floarea soarelui, sare.

Atenționări: A nu se amesteca cu alte coccidiostatice sau produse care conțin coccidiostatice! Periculos pentru cabaline. Acest furaj conține un ionofor: evitați administrarea simultană cu tiamulin și monitorizați eventualele reacții adverse atunci când este utilizat concomitent cu alte substanțe medicamentoase. Trebuie evitată utilizarea simultană cu apă de băut în care s-a adăugat clorură de colină. Utilizarea simultană a diferiților acizi organici sau a sărurilor acestora este contraindicată în cazul în care unul sau mai mulți dintre aceștia sunt utilizați într-o cantitate corespunzătoare conținutului maxim permis sau apropiată de acesta. **Interzis la rumegătoare.**

Perioada de așteptare la carne: a nu se folosi cu cel puțin 3 zile înainte de sacrificare.

A SE PĂSTRA LA LOC USCAT ȘI RĂCOROS.



Valori nutriționale		Umiditate	%	10.66
		Proteine brute	%	25
		Grăsimi brute	%	3.03
		Fibre brute	%	6.55
		Cenușă brută	%	9.34
		Fosfor	%	1
		Calciu	%	1.18
		Lizină	%	1.34
		Metionină	%	0.51
		Sodiu	%	0.17
Aditivi nutriționali				
Vitamine	3a672a	Vitamina A	UI/Kg	10000
	3a671	Vitamina D3	UI/Kg	4500
	3a700i	Vitamina E	mg/Kg	65
	3a711	Vitamina K (ca MNB)	mg/Kg	3
	3a821	Vitamina B1 (ca mononitrat de tiamină)	mg/Kg	2.5
	3a825ii	Vitamina B2	mg/Kg	6.5
	3a841	D-pantotenat de calciu	mg/Kg	18
	3a831	Vitamina B6	mg/Kg	3.2
	3a835	Vitamina B12	mg/Kg	0.017
	3a314	Niacina	mg/Kg	60
	3a316	Acid folic	mg/Kg	1.9
	3a880	Biotină	mg/Kg	0.18
	3a890	Clorură de colină	mg/Kg	200
	3a920	Betaină	mg/Kg	182.5
Minerale	3b103	Fier (Sulfat de fier (II) monohidrat)	mg/Kg	20
	3b405	Cupru (Sulfat de cupru (II) pentahidrat)	mg/Kg	16
	3b502	Mangan (oxid (II) manganos)	mg/Kg	120
	3b603	Zinc (oxid de zinc)	mg/Kg	110
	3b203	Iod (iodat de calciu anhidru granulat învelit)	mg/Kg	1.25
	3b802	Seleniu (selenit de sodiu granulat învelit)	mg/Kg	0.3
Aminoacizi	3c301	DL- metionină	mg/Kg	990
	3c322	L-lizină (clorhidrat)	mg/Kg	780
Aditivi zootehnici				
Promotori de digestibilitate	4a1602i	Endo-1, 4-beta glucanază EC 3.2.1.4	U/kg	32
	4a1602i	Endo-1, 3-beta glucanază EC 3.2.1.6	U/kg	28
	4a1602i	Endo-1, 4-beta xilanază EC 3.2.1.8	U/kg	108
	4a18i	6 - Fitază (EC 3.1.3.26)	FYT/kg	1000
Coccidiostatice și histomonostatice				
Coccidiostatic	5 1 701	Coxidin (monensin sodic)	mg/Kg	100
Aditivi tehnologici				
Antioxidanți	E321	BHT	mg/Kg	0.70
	E310	Propil galat	mg/Kg	0.06
Conservanți	1a330	Acid citric	mg/Kg	0.18
Antiaglomeranți	E551a	Acid silicic	mg/Kg	15.27

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLET GĂINI GĂINI - OUĂTOARE

Mod de utilizare: se administrează la discreție la găinile ouătoare, având apă la discreție.

Compoziție: făină de porumb, șrot de floarea soarelui, gluten din porumb, tărâță de grâu, carbonat de calciu, șrot de soia (OMG*), orz, ulei din floarea soarelui, fosfat monocalcic, sare.

Atenționări: A se evita utilizarea simultană cu apa de băut în care a fost adăugată clorură de colină. Utilizarea simultană a diferiților acizi organici sau a sărurilor acestora este contraindicată în cazul în care unul sau mai mulți dintre aceștia sunt utilizați într-o cantitate corespunzătoare conținutului maxim permis sau apropiată de acesta. **Interzis la rumegătoare.**

A SE PĂSTRA LA LOC USCAT ȘI RĂCOROS.



Valori nutriționale		Umiditate	%	10.46
		Proteine brute	%	16
		Grăsimi brute	%	3.52
		Fibre brute	%	6.49
		Cenușă brută	%	16.41
		Fosfor	%	0.66
		Calciu	%	4.02
		Lizină	%	61
		Metionină	%	0.31
		Sodiu	%	0.17
Aditivi nutriționali				
Vitamine	3a672a	Vitamina A	UI/Kg	8000
	3a671	Vitamina D3	UI/Kg	2000
	3a700i	Vitamina E	mg/Kg	15
	3a711	Vitamina K (ca MNB)	mg/Kg	2
	3a821	Vitamina B1 (ca mononitrat de tiamină)	mg/Kg	1.5
	3a825ii	Vitamina B2	mg/Kg	4
	3a841	D-pantotenat de calciu	mg/Kg	8
	3a831	Vitamina B6	mg/Kg	3
	3a835	Vitamina B12	mg/Kg	0.015
	3a314	Niacina	mg/Kg	20
Minerale	3a880	Biotină	mg/Kg	0.025
	3a890	Clorură de colină	mg/Kg	400
	3b405	Cupru (Sulfat de cupru (II) pentahidrat)	mg/Kg	5
	3b502	Mangan (oxid (II) manganos)	mg/Kg	70
	3b603	Zinc (oxid de zinc)	mg/Kg	50
	3b203	Iod (iodat de calciu anhidru granulat învelit)	mg/Kg	0.8
	3b802	Seleniu (selenit de sodiu granulat învelit)	mg/Kg	0.2
Aditivi zootehnici				
Antioxidanți	E321	BHT	mg/kg	0.70
	E310	Propil galat	mg/Kg	0.06
Conservanți	1a330	Acid citric	mg/Kg	0.18
Antiaglomeranți	E551a	Acid silicic	mg/Kg	15.00

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLET PUI CREȘTERE - FINISARE

Mod de utilizare: se administrează la puii de carne de 30 zile-sacrificare, având apă la discreție.

Compoziție: făină de porumb, orz, tărâță de grâu, șrot de floarea soarelui, șrot de soia (OMG*), gluten din porumb, carbonat de calciu, fosfat monocalcic, ulei din floarea soarelui, sare.

Atenționări: A nu se amesteca cu alte coccidiostatice sau produse care conțin coccidiostatice! Periculos pentru cabaline. Acest furaj conține un ionofor: evitați administrarea simultană cu tiamulin și monitorizați eventualele reacții adverse atunci când este utilizat concomitent cu alte substanțe medicamentoase. Trebuie evitată utilizarea simultană cu apă de băut în care s-a adăugat clorură de colină. Utilizarea simultană a diferiților acizi organici sau a sărurilor acestora este contraindicată în cazul în care unul sau mai mulți dintre aceștia sunt utilizați într-o cantitate corespunzătoare conținutului maxim permis sau apropiată de acesta. **Interzis la rumegătoare.**

Perioada de așteptare la carne: a nu se folosi cu cel puțin 3 zile înainte de sacrificare.

A SE PĂSTRA LA LOC USCAT ȘI RĂCOROS.



Valori nutriționale	Umiditate		%	12
	Proteine brute		%	18
	Grăsimi brute		%	3.7
	Fibre brute		%	9
	Cenușă brută		%	5.5
	Fosfor		%	0.4
	Calciu		%	1
	Lizină		%	0.72
	Metionină		%	0.42
	Sodiu		%	0.2
Aditivi nutriționali				
Vitamine	3a672a	Vitamina A	UI/Kg	10000
	3a671	Vitamina D3	UI/Kg	4500
	3a700i	Vitamina E	mg/Kg	65
	3a711	Vitamina K (ca MNB)	mg/Kg	3
	3a821	Vitamina B1 (ca mononitrat de tiamină)	mg/Kg	2.5
	3a825ii	Vitamina B2	mg/Kg	6.5
	3a841	D-pantotenat de calciu	mg/Kg	18
	3a831	Vitamina B6	mg/Kg	3.2
	3a835	Vitamina B12	mg/Kg	0.017
	3a314	Niacina	mg/Kg	60
	3a316	Acid folic	mg/Kg	1.9
	3a880	Biotină	mg/Kg	0.18
	3a890	Clorură de colină	mg/Kg	200
	3a920	Betaină	mg/Kg	182.5
Minerale	3b103	Fier (Sulfat de fier (II) monohidrat)	mg/Kg	20
	3b405	Cupru (Sulfat de cupru (II) pentahidrat)	mg/Kg	16
	3b502	Mangan (oxid (II) manganos)	mg/Kg	120
	3b603	Zinc (oxid de zinc)	mg/Kg	110
	3b203	Iod (iodat de calciu anhidru granulat învelit)	mg/Kg	1.25
	3b802	Seleniu (selenit de sodiu granulat învelit)	mg/Kg	0.3
Aditivi zootehnici				
Promotori de digestibilitate	4a1602i	Endo-1, 4-beta glucanază EC 3.2.1.4	U/kg	32
	4a1602i	Endo-1, 3-beta glucanază EC 3.2.1.6	U/kg	28
	4a1602i	Endo-1, 4-beta xilanază EC 3.2.1.8	U/kg	108
	4a18i	6 - Fitază (EC 3.1.3.26)	FYT/kg	1000
Coccidiostatice și histomonostatice				
Coccidiostatic	5 1 701	Coxidin (monensin sodic)	mg/Kg	100
Aditivi tehnologici				
Antioxidanți	E321	BHT	mg/Kg	0.70
	E310	Propil galat	mg/Kg	0.06
Conservanți	1a330	Acid citric	mg/Kg	0.18
Antiaglomeranți	E551a	Acid silicic	mg/Kg	15.27

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLET PUI DE CURCĂ - CREȘTERE

Mod de utilizare: se administrează la puii de curcă în perioada de creștere, având apă la discreție.

Compoziție: șrot de soia (OMG*), gluten din porumb, orz, tărâță de grâu, șrot de floarea soarelui, făină de porumb, carbonat de calciu, ulei din floarea soarelui, fosfat monocalcic, sare.

Atenționări: A nu se amesteca cu alte coccidiostatice sau produse care conțin coccidiostatice! Periculos pentru cabaline. Acest furaj conține un ionofor: evitați administrarea simultană cu tiamulin și monitorizați eventualele reacții adverse atunci când este utilizat concomitent cu alte substanțe medicamentoase. Trebuie evitată utilizarea simultană cu apă de băut în care s-a adăugat clorură de colină. Utilizarea simultană a diferiților acizi organici sau a sărurilor acestora este contraindicată în cazul în care unul sau mai mulți dintre aceștia sunt utilizați într-o cantitate corespunzătoare conținutului maxim permis sau apropiată de acesta. **Interzis la rumegătoare.**

Perioada de așteptare carne: a nu se folosi cu cel puțin 3 zile înainte de sacrificare.

A SE PĂSTRA LA LOC USCAT ȘI RĂCOROS.



Valori nutriționale		Umiditate	%	10.54
		Proteine brute	%	23
		Grăsimi brute	%	3.97
		Fibre brute	%	7.43
		Cenușă brută	%	9.2
		Fosfor	%	0.98
		Calciu	%	1.2
		Lizină	%	1.15
		Metionină	%	0.5
		Sodiu	%	0.18
Aditivi nutriționali				
Vitamine	3a672a	Vitamina A	UI/Kg	10000
	3a671	Vitamina D3	UI/Kg	4500
	3a700i	Vitamina E	mg/Kg	65
	3a711	Vitamina K (ca MNB)	mg/Kg	3
	3a821	Vitamina B1 (ca mononitrat de tiamină)	mg/Kg	2.5
	3a825ii	Vitamina B2	mg/Kg	6.5
	3a841	D-pantotenat de calciu	mg/Kg	18
	3a831	Vitamina B6	mg/Kg	3.2
	3a835	Vitamina B12	mg/Kg	0.017
	3a314	Niacina	mg/Kg	60
	3a316	Acid folic	mg/Kg	1.9
	3a880	Biotină	mg/Kg	0.18
	3a890	Clorură de colină	mg/Kg	200
	3a920	Betaină	mg/Kg	182.5
Minerale	3b103	Fier (Sulfat de fier (II) monohidrat)	mcg/kg	20
	3b405	Cupru (Sulfat de cupru (II) pentahidrat)	mg/Kg	16
	3b502	Mangan (oxid (II) manganos)	mg/Kg	120
	3b603	Zinc (oxid de zinc)	mg/Kg	110
	3b203	Iod (iodat de calciu anhidru granulat învelit)	mg/Kg	1.25
	3b802	Seleniu (selenit de sodiu granulat învelit)	mg/Kg	0.3
	3c301	DL- metionină	mg/Kg	990
Aminoacizi	3c322	L-lizină (clorhidrat)	mg/Kg	780
Aditivi zootehnici				
Promotori de digestibilitate	4a1602i	Endo-1, 4-beta glucanază EC 3.2.1.4	U/kg	32
	4a1602i	Endo-1, 3-beta glucanază EC 3.2.1.6	U/kg	28
	4a1602i	Endo-1, 4-beta xilanază EC 3.2.1.8	U/kg	108
	4a18i	6 - Fitază (EC 3.1.3.26)	FYT/kg	1000
Coccidiostatice și histomonostatice				
Coccidiostatic	5 1 701	Coxidin (monensin sodic)	mg/Kg	100
Aditivi tehnologici				
Antioxidanți	E321	BHT	mg/Kg	0.70
	E310	Propil galat	mg/Kg	0.06
Conservanți	1a330	Acid citric	mg/Kg	0.18
Antiaglomeranți	E551a	Acid silicic	mg/Kg	15.27

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLET RAȚE - GÂȘTE - CREȘTERE

Mod de utilizare: se administrează la discreție la rațe și gâște aflate în perioada de creștere având apă la discreție.

Compoziție: făină de porumb, orz, tărâță de grâu, șrot de floare soarelui, gluten din porumb, carbonat de calciu, șrot de soia (OMG*), fosfat monocalcic, sare.

Atenționări: A se evita utilizarea simultană cu apa de băut în care a fost adăugată clorură de colină. Utilizarea simultană a diferiților acizi organici sau a sărurilor acestora este contraindicată în cazul în care unul sau mai mulți dintre aceștia sunt utilizați într-o cantitate corespunzătoare conținutului maxim permis sau apropiată de acesta. **Interzis la rumegătoare.**

A SE PĂSTRA LA LOC USCAT ȘI RĂCOROS.



Valori nutriționale		Umiditate	%	10.62
		Proteine brute	%	14.49
		Grăsimi brute	%	3.47
		Fibre brute	%	6.43
		Cenușă brută	%	15.88
		Fosfor	%	63
		Calciu	%	4
		Lizină	%	0.54
		Metionină	%	0.28
		Sodiu	%	0.16
Aditivi nutriționali				
Vitamine	3a672a	Vitamina A	UI/Kg	8000
	3a671	Vitamina D3	UI/Kg	2000
	3a700i	Vitamina E	mg/Kg	15
	3a711	Vitamina K (ca MNB)	mg/Kg	2
	3a821	Vitamina B1 (ca mononitrat de tiamină)	mg/Kg	1.5
	3a825ii	Vitamina B2	mg/Kg	4
	3a841	D-pantotenat de calciu	mg/Kg	8
	3a831	Vitamina B6	mg/Kg	3
	3a835	Vitamina B12	mg/Kg	0.015
	3a314	Niacina	mg/Kg	20
	3a880	Biotină	mg/Kg	0.025
	3a890	Clorură de colină	mg/Kg	400
Minerale	3b405	Cupru (Sulfat de cupru (II) pentahidrat)	mg/Kg	5
	3b502	Mangan (oxid (II) manganos)	mg/Kg	70
	3b603	Zinc (oxid de zinc)	mg/Kg	50
	3b203	Iod (iodat de calciu anhidru granulat învelit)	mg/Kg	0.8
	3b802	Seleniu (selenit de sodiu granulat învelit)	mg/Kg	0.2
Aditivi tehnologici				
Antioxidanți	E321	BHT	mg/Kg	0.70
	E310	Propil galat	mg/Kg	0.06
Conservanți	1a330	Acid citric	mg/Kg	0.18
Antiaglomeranți	E551a	Acid silicic	mg/Kg	15.00

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLET PENTU PORCI START - CREȘTERE

Mod de utilizare: se administrează la purcei de la greutatea de 25 kg, având apă la discreție.

Compoziție: porumb, grâu, șrot de floarea soarelui, tărâțe de grâu, șrot de soia (OMG*), carbonat de calciu, fosfat monocalcic, sare.

Atenționări: Poate produce reacții alergice. A se evita utilizarea simultană cu apa de băut în care a fost adăugată clorură de colină. Utilizarea simultană a diferiților acizi organici sau a sărurilor acestora este contraindicată în cazul în care unul sau mai mulți dintre aceștia sunt utilizați într-o cantitate corespunzătoare conținutului maxim permis sau apropiată de acesta. **Interzis la rumegătoare.**

A SE PĂSTRA LA LOC USCAT ȘI RĂCOROS.



Valori nutriționale		Umiditate	%	12
		Proteine brute	%	15
		Grăsimi brute	%	2.7
		Fibre brute	%	5.1
		Cenușă brută	%	3.9
		Fosfor	%	0.61
		Calciu	%	0.98
		Lizină	%	0.6
		Metionină	%	0.32
		Sodiu	%	0.2
Aditivi nutriționali				
Vitamine	3a672a	Vitamina A	UI/kg	6500
	3a671	Vitamina D3	UI/kg	2000
	3a700i	Vitamina E	mg/kg	60
	3a711	Vitamina K (ca MNB)	mg/kg	1.5
	3a821	Vitamina B1 (ca mononitrat de tiamină)	mg/kg	1.5
	3a825ii	Vitamina B2	mg/kg	3.5
	3a841	D-pantotenat de calciu	mg/kg	12.5
	3a831	Vitamina B6	mg/kg	1.5
	3a835	Vitamina B12	mg/kg	0.03
	3a314	Niacina	mg/kg	20
	3a880	Biotină	mg/kg	0.025
	3a890	Clorură de colină	mg/kg	90
Minerale	3b103	Fier (Sulfat de fier (II) monohidrat)	mg/Kg	75
	3b405	Cupru (Sulfat de cupru (II) pentahidrat)	mg/Kg	15
	3b502	Mangan (oxid (II) manganos)	mg/Kg	35
	3b603	Zinc (oxid de zinc)	mg/Kg	85
	3b203	Iod (iodat de calciu anhidru granulat învelit)	mg/Kg	1.25
	3b802	Seleniu (selenit de sodiu granulat învelit)	mg/Kg	0.25
Aminoacizi	3c322	L-lizină (clorhidrat)	mg/Kg	780
Aditivi zootehnici				
Promotori de digestibilitate	4a18i	6 - Fitază (EC 3.1.3.26)	FYT/kg	750
Aditivi tehnologici				
Antioxidanți	E321	BHT	mg/Kg	0.70
	E310	Propil galat	mg/Kg	0.06
Conservanți	1a330	Acid citric	mg/Kg	0.175
Antiaglomeranți	E551a	Acid silicic	mg/Kg	15.07
PRODUSUL NU CONȚINE FĂINURI DE ORIGINE ANIMALĂ				

VITALINE PREMIUM FURAJ COMPLEMENTAR PENTU IEPURI IEPURI LA ÎNGRĂȘARE

Mod de utilizare: se administrează la discreție pentru iepuri la îngrășat, ca parte a rației animalelor, în combinație cu fibroase de calitate (făinuri și paie de cereale), rata de includere de 1:2 (furaj:fibroase).

Compoziție: făină de porumb, șrot de floarea soarelui, tărâță de grâu, lucernă, orz, carbonat de calciu, sare, ulei din floarea soarelui.

Atenționări: A nu se amesteca cu alte coccidiostatice sau produse care conțin coccidiostatice! Utilizarea simultană a diferiților acizi organici sau a sărurilor acestora este contraindicată în cazul în care unul sau mai mulți dintre aceștia sunt utilizați într-o cantitate corespunzătoare conținutului maxim permis sau apropiată de acesta. **Interzis la rumegătoare.**

Perioada de așteptare: a nu se utiliza cu 2 zile înainte de abatorizare.

A SE PĂSTRA LA LOC USCAT ȘI RĂCOROS.



Valori nutriționale	Umiditate		%	11.6
	Proteine brute		%	17
	Grăsimi brute		%	3.52
	Fibre brute		%	12.21
	Cenușă brută		%	8.53
	Fosfor		%	0.59
	Calciu		%	0.81
	Sodiu		%	0.15
Aditivi nutriționali				
Vitamine	3a672a	Vitamina A	UI/kg	9500
	3a671	Vitamina D3	UI/kg	2000
	3a700i	Vitamina E	mg/kg	25
	3a711	Vitamina K (ca MNB)	mg/kg	2.5
	3a821	Vitamina B1 (ca mononitrat de tiamina)	mg/kg	3
	3a825ii	Vitamina B2	mg/kg	7
	3a841	D-pantotenat de calciu	mg/kg	13.5
	3a831	Vitamina B6	mg/kg	4
	3a835	Vitamina B12	mg/kg	0.02
	3a314	Niacina	mg/kg	50
	3a316	Acid folic	mg/kg	0.8
	3a880	Biotină	mg/kg	0.2
3a890	Clorură de colină	mg/kg	250	
Minerale	3b103	Fier (Sulfat de fier (II) monohidrat)	mg/kg	70
	3b405	Cupru (Sulfat de cupru (II) pentahidrat)	mg/kg	10
	3b502	Mangan (oxid (II) manganos)	mg/kg	60
	3b603	Zinc (oxid de zinc)	mg/kg	70
	3b203	Iod (iodat de calciu anhidru granulat învelit)	mg/kg	1.25
	3b802	Seleniu (selenit de sodiu granulat învelit)	mg/kg	0.3
Coccidiostatice și histomonostatice				
Coccidiostatic	5 1 755	Diclazuril	mg/kg	1
Aditivi tehnologici				
Antioxidanți	E321	BHT	mg/Kg	0.70
	E310	Propil galat	mg/Kg	0.06
Antiaglomeranți	E551a	Acid silicic	ppm/kg	25.21
PRODUSUL NU CONTINE FĂINURI DE ORIGINE ANIMALĂ				

FURAJ COMPLEMENTAR PENTRU MIEI FAZĂ 1

Mod de utilizare: se administrează la miei pentru îngrășat - creștere între 15-30 kg, ca parte a rației animalelor, în combinație cu fibroase de calitate (fânuri și paie de cereale) cu rată de includere de 1:2 (furaj:fibroase). Se administrează pentru maxim 3 luni.

Compoziție: făină de porumb, tărâță de grâu, radicele de orz, șrot de floarea soarelui, orz, carbonat de calciu, ulei din floarea soarelui, sare, bicarbonat sodiu, oxid de magneziu.

Atenționări: Se recomandă limitarea suplimentării cu cobalt la 0,3 mg/kg în furaj complet. În acest context, ar trebui luat în considerare riscul de deficit de cobalt din cauza condițiilor locale și a compoziției specifice a rației.

A SE PĂSTRA LA LOC USCAT ȘI RĂCOROS.



Valori nutriționale		Umiditate	%	11.73
		Proteine brute	%	16
		Grăsimi brute	%	3.96
		Fibre brute	%	6.85
		Cenușă brută	%	9.05
		Fosfor	%	0.56
		Calciu	%	1.12
		Sodiu	%	0.2
		Magneziu	%	10.6
Aditivi nutriționali				
Vitamine	3a672a	Vitamina A	UI/kg	9500
	3a671	Vitamina D3	UI/kg	2000
	3a700	Vitamina E	mg/kg	15
	3a890	Clorură de colină	mg/kg	70
Minerale	3b503	Mangan (Sulfat de mangan monohidrat)	mg/kg	35
	3b103	Fier (Sulfat de fier monohidrat)	mg/kg	20
	3b605	Zinc (Sulfat de zinc monohidrat)	mg/kg	80
	3b201	Iod (Iodură de potasiu)	mg/kg	0.5
	3b304	Cobalt (Carbonat de cobalt (II) granular învelit)	mg/kg	0.3
	3b801	Seleniu (Selenit de sodiu)	mg/kg	0.25
Aditivi zootehnici				
Alți aditivi zootehnici	4d7	Clorură de amoniu	mg/kg	5000 6000 7000 sau 8000
Aditivi senzoriali				
Compuși aromatizanți	2b	Amestec compuși aromatizanți	mg/Kg	3.75
Aditivi tehnologici				
Antiaglomeranți	E551a	Acid silicic	mg/Kg	35.00
PRODUSUL NU CONTINE FĂINURI DE ORIGINE ANIMALĂ				

FURAJ COMPLEMENTAR PENTRU MIEI FAZĂ 2

Mod de utilizare: se administrează la miei pentru îngrășat - finisare >30 kg, ca parte a rației animalelor, în combinație cu fibroase de calitate (fânuri și paie de cereale) cu rată de includere de 1:4 (furaj:fibroase). Se administrează pentru maxim 3 luni.

Compoziție: făină de porumb, tărâță grâu, radicele de orz, șrot de floarea soarelui, orz, carbonat de calciu, ulei din floarea soarelui, bicarbonat de sodiu, sare, oxid de magneziu.

Atenționări: Se recomandă limitarea suplimentării cu cobalt la 0,3 mg/kg în furaj complet. În acest context, ar trebui luat în considerare riscul de deficit de cobalt din cauza condițiilor locale și a compoziției specifice a rației.

A SE PĂSTRA LA LOC USCAT ȘI RĂCOROS.



Valori nutriționale		Umiditate	%	11.96
		Proteine brute	%	14.5
		Grăsimi brute	%	4.03
		Fibre brute	%	5.79
		Cenușă brută	%	8.93
		Fosfor	%	0.54
		Calciu	%	1.07
		Sodiu	%	0.16
		Magneziu	%	10.58
Aditivi nutriționali				
Vitamine	3a672a	Vitamina A	UI/kg	9500
	3a671	Vitamina D3	UI/kg	2000
	3a700	Vitamina E	mg/kg	15
	3a890	Clorură de colină	mg/kg	70
Minerale	3b503	Mangan (Sulfat de mangan monohidrat)	mg/kg	35
	3b103	Fier (Sulfat de fier monohidrat)	mg/kg	20
	3b605	Zinc (Sulfat de zinc monohidrat)	mg/kg	80
	3b201	Iod (Iodură de potasiu)	mg/kg	0.5
	3b304	Cobalt (Carbonat de cobalt (II) granular învelit)	mg/kg	0.3
	3b801	Seleniu (Selenit de sodiu)	mg/kg	0.25
Aditivi zootehnici				
Alți aditivi zootehnici	4d7	Clorură de amoniu	mg/kg	5000 6000 7000 sau 8000
Aditivi senzoriali				
Compuși aromatizanți	2b	Amestec compuși aromatizanți	mg/Kg	3.75
Aditivi tehnologici				
Antiaglomeranți	E551a	Acid silicic	mg/Kg	35.00
PRODUSUL NU CONTINE FĂINURI DE ORIGINE ANIMALĂ				

FURAJ COMPLEMENTAR PENTRU VIȚEI FAZĂ 1

Mod de utilizare: se administrează la tineret taurin, de la 3 până la 6 luni, conform tehnologiei de creștere ca parte a rației animalelor, în combinație cu fibroase de calitate (fânuri și paie de cereale) cu rată de includere de 1:2 (furaj:fibroase).

Compoziție: făină de porumb, gluten din porumb, șrot floarea soarelui, șrot de soia (OMG*), radicele orz, tărâță de grâu, tărâță de orez, melasă, carbonat calciu, ulei din floarea soarelui, bicarbonat sodiu.

A SE PĂSTRA LA LOC USCAT ȘI RĂCOROS.



Valori nutriționale		Umiditate	%	11.26
		Proteine brute	%	20
		Grăsimi brute	%	3.5
		Fibre brute	%	7.43
		Cenușă brută	%	9.03
		Fosfor	%	0.65
		Calciu	%	0.99
		Sodiu	%	0.23
		Magneziu	%	0.48
Aditivi nutriționali				
Vitamine	3a672a	Vitamina A	UI/kg	8000
	3a671	Vitamina D3	UI/kg	1200
	3a700	Vitamina E	mg/kg	35
	3a890	Clorură de colină	mg/kg	70
Minerale	3b103	Fier (Sulfat de fier (II) monohidrat)	mg/kg	50
	3b502	Mangan (oxid (II) manganos)	mg/kg	60
	3b603	Zinc (oxid de zinc)	mg/kg	60
	3b203	Iod (iodat de calciu anhidru granulat învelit)	mg/kg	0.35
	3b802	Seleniu (selenit de sodiu granular învelit)	mg/kg	0.45
Aditivi tehnologici				
Conservanți	1a330	Acid citric	mg/kg	0.18
Antioxidanți	E321	BHT	mg/kg	1.51
	E310	Propil galat	mg/kg	0.06
Antiaglomeranți	E551a	Acid silicic	mg/Kg	15
PRODUSUL NU CONȚINE FĂINURI DE ORIGINE ANIMALĂ				

FURAJ COMPLEMENTAR PENTRU VIȚEI FAZĂ 2

Mod de utilizare: se administrează la tineret taurin, de la 7 până la 18 luni, conform tehnologiei de creștere ca parte a rației animalelor, în combinație cu fibroase de calitate (fânuri și paie de cereale) cu rată de includere de 1:5 (furaj:fibroase).

Compoziție: făină de porumb, tărâță de grâu, șrot floarea soarelui, radicele orz, orz, carbonat de calciu, ulei din floarea soarelui, sare, bicarbonat sodiu, oxid magneziu.

A SE PĂSTRA LA LOC USCAT ȘI RĂCOROS.



Valori nutriționale		Umiditate	%	11.8
		Proteine brute	%	15
		Grăsimi brute	%	4
		Fibre brute	%	7.04
		Cenușă brută	%	9.07
		Fosfor	%	0.54
		Calciu	%	1.09
		Sodiu	%	0.2
		Magneziu	%	0.59
Aditivi nutriționali				
Vitamine	3a672a	Vitamina A	UI/kg	8000
	3a671	Vitamina D3	UI/kg	1200
	3a700	Vitamina E	mg/kg	35
	3a890	Clorură de colină	mg/kg	70
Minerale	3b103	Fier (Sulfat de fier (II) monohidrat)	mg/kg	50
	3b502	Mangan (oxid (II) manganos)	mg/kg	60
	3b603	Zinc (oxid de zinc)	mg/kg	60
	3b203	Iod (iodat de calciu anhidru granulat învelit)	mg/kg	0.35
	3b802	Seleniu (selenit de sodiu granular învelit)	mg/kg	0.45
Aditivi tehnologici				
Conservanți	1a330	Acid citric	mg/kg	0.18
Antioxidanți	E321	BHT	mg/kg	1.51
	E310	Propil galat	mg/kg	0.06
Antiaglomeranți	E551a	Acid silicic	mg/Kg	15
PRODUSUL NU CONȚINE FĂINURI DE ORIGINE ANIMALĂ				

FURAJ COMPLEMENTAR PENTRU VIȚEI FAZĂ 3

Mod de utilizare: se administrează la viței pentru îngrășat în combinație cu fibroase, având apă la discreție.

Compoziție: tărâță de grâu, făină de porumb, șrot floarea soarelui, radicele orz, orz, carbonat de calciu, ulei floarea soarelui, fosfat monocalcic, bicarbonat de sodiu, oxid de magneziu.

A SE PĂSTRA LA LOC USCAT ȘI RĂCOROS.



Valori nutriționale		Umiditate	%	11.19
		Proteine brute	%	17
		Grăsimi brute	%	3.86
		Fibre brute	%	8.47
		Cenușă brută	%	9.48
		Fosfor	%	0.75
		Calciu	%	1.4
		Sodiu	%	0.28
		Magneziu	%	0.64
Aditivi nutriționali				
Vitamine	3a672a	Vitamina A	UI/kg	8000
	3a671	Vitamina D3	UI/kg	1200
	3a700	Vitamina E	mg/kg	35
	3a890	Clorură de colină	mg/kg	70
Minerale	3b103	Fier (Sulfat de fier (II) monohidrat)	mg/kg	50
	3b502	Mangan (oxid (II) manganos)	mg/kg	60
	3b603	Zinc (oxid de zinc)	mg/kg	60
	3b203	Iod (iodat de calciu anhidru granulat învelit)	mg/kg	0.35
	3b802	Seleniu (selenit de sodiu granular învelit)	mg/kg	0.45
Aditivi tehnologici				
Conservanți	1a330	Acid citric	mg/kg	0.18
Antioxidanți	E321	BHT	mg/kg	1.51
	E310	Propil galat	mg/kg	0.06
Antiaglomeranți	E551a	Acid silicic	mg/Kg	15
PRODUSUL NU CONȚINE FĂINURI DE ORIGINE ANIMALĂ				

FURAJ COMPLET PENTRU PUI STARTER RURAL

Mod de utilizare: se administrează la puii de carne între 1-30 zile, având apă la discreție.

Compoziție: tărață de grau, făină de porumb, șrot de soia(OMG*), șrot de floarea soarelui, gluten din porumb, orz, carbonat de calciu, ulei din floarea soarelui, fosfat monocalcic, sare.

Atenționări: A nu se amesteca cu alte coccidiostatice sau produse care conțin coccidiostatice! Periculos pentru cabaline. Acest furaj conține un ionofor: evitați administrarea simultană cu tiamulin și monitorizați eventualele reacții adverse atunci când este utilizat concomitent cu alte substanțe medicamentoase. Trebuie evitată utilizarea simultană cu apă de băut în care s-a adăugat clorură de colină. Utilizarea simultană a diferiților acizi organici sau a sărurilor acestora este contraindicată în cazul în care unul sau mai mulți dintre aceștia sunt utilizați într-o cantitate corespunzătoare conținutului maxim permis sau apropiată de acesta. **Interzis la rumegătoare.**

Perioada de așteptare la carne: a nu se folosi cu cel puțin 3 zile înainte de sacrificare.

A SE PĂSTRA LA LOC USCAT ȘI RĂCOROS.



Valori nutriționale		Umiditate	%	11.42
		Proteine brute	%	18
		Grăsimi brute	%	3.97
		Fibre brute	%	6.51
		Cenușă brută	%	9.07
		Fosfor	%	0.81
		Calciu	%	0.9
		Lizină	%	0.78
		Metionină	%	0.32
		Sodiu	%	0.16
Aditivi nutriționali				
Vitamine	3a672a	Vitamina A	UI/Kg	10000
	3a671	Vitamina D3	UI/Kg	4500
	3a700i	Vitamina E	mg/Kg	65
	3a711	Vitamina K (ca MNB)	mg/Kg	3
	3a821	Vitamina B1 (ca mononitrat de tiamină)	mg/Kg	2.5
	3a825ii	Vitamina B2	mg/Kg	6.5
	3a841	D-pantotenat de calciu	mg/Kg	18
	3a831	Vitamina B6	mg/Kg	3.2
	3a835	Vitamina B12	mg/Kg	0.017
	3a314	Niacina	mg/Kg	60
	3a316	Acid folic	mg/Kg	1.9
	3a880	Biotină	mg/Kg	0.18
	3a890	Clorură de colină	mg/Kg	200
	3a920	Betaină	mg/Kg	182.5
Minerale	3b103	Fier (Sulfat de fier (II) monohidrat)	mg/Kg	20
	3b405	Cupru (Sulfat de cupru (II) pentahidrat)	mg/Kg	16
	3b502	Mangan (oxid (II) manganos)	mg/Kg	120
	3b603	Zinc (oxid de zinc)	mg/Kg	110
	3b203	Iod (iodat de calciu anhidru granulat învelit)	mg/Kg	1.25
	3b802	Seleniu (selenit de sodiu granulat învelit)	mg/Kg	0.3
Aditivi zootehnici				
Promotori de digestibilitate	4a1602i	Endo-1, 4-beta glucanază EC 3.2.1.4	U/kg	32
	4a1602i	Endo-1, 3-beta glucanază EC 3.2.1.6	U/kg	28
	4a1602i	Endo-1, 4-beta xilanază EC 3.2.1.8	U/kg	108
	4a18i	6 - Fitază (EC 3.1.3.26)	FYT/kg	1000
Coccidiostatice și histomonostatice				
Coccidiostatic	5 1 701	Coxidin (monensin sodic)	mg/Kg	100
Aditivi tehnologici				
Antioxidanți	E321	BHT	mg/Kg	0.70
	E310	Propil galat	mg/Kg	0.06
Conservanți	1a330	Acid citric	mg/Kg	0.04
Antiaglomeranți	E551a	Acid silicic	mg/Kg	15.27

FURAJ COMPLET PENTRU PUI CURCĂ START RURAL

Mod de utilizare: se administrează la puii de curcă între 1-30 zile, având apă la discreție.

Compoziție: șrot de soia (OMG*), sorg, gluten din porumb, mălai din porumb, tărațe grâu, șrot floarea soarelui, tărață orez, germeni porumb, carbonat de calciu, fosfat monocalcic, sare.

Atenționări: A nu se amesteca cu alte coccidiostatice sau produse care contin coccidiostatice! Periculos pentru cabaline. Acest furaj conține un ionofor: evitați administrarea simultană cu tiamulin și monitorizați eventualele reacții adverse atunci când este utilizat concomitent cu alte substanțe medicamentoase. Trebuie evitată utilizarea simultană cu apă de băut în care s-a adăugat clorură de colină. Utilizarea simultană a diferiților acizi organici sau a sărurilor acestora este contraindicată în cazul în care unul sau mai mulți dintre aceștia sunt utilizați într-o cantitate corespunzătoare conținutului maxim permis sau apropiată de acesta. **Interzis la rumegătoare.**

Perioada de așteptare la carne: a nu se folosi cu cel puțin 3 zile înainte de sacrificare.

A SE PĂSTRA LA LOC USCAT ȘI RĂCOROS.



Valori nutriționale		Umiditate	%	12
		Proteine brute	%	23
		Grăsimi brute	%	3.8
		Fibre brute	%	7.8
		Cenușă brută	%	6.1
		Fosfor	%	0.7
		Calciu	%	1.3
		Lizină	%	1.1
		Metionină	%	0.52
		Sodiu	%	0.2
Aditivi nutriționali				
Vitamine	3a672a	Vitamina A	UI/Kg	10000
	3a671	Vitamina D3	UI/Kg	4500
	3a700i	Vitamina E	mg/Kg	65
	3a711	Vitamina K (ca MNB)	mg/Kg	3
	3a821	Vitamina B1 (ca mononitrat de tiamină)	mg/Kg	2.5
	3a825ii	Vitamina B2	mg/Kg	6.5
	3a841	D-pantotenat de calciu	mg/Kg	18
	3a831	Vitamina B6	mg/Kg	3.2
	3a835	Vitamina B12	mg/Kg	0.02
	3a314	Niacina	mg/Kg	60
	3a316	Acid folic	mg/Kg	1.9
	3a880	Biotină	mg/Kg	0.18
	3a890	Clorură de colină	mg/Kg	200
	3a920	Betaină	mg/Kg	182.5
Minerale	3b103	Fier (Sulfat de fier (II) monohidrat)	mg/Kg	20
	3b405	Cupru (Sulfat de cupru (II) pentahidrat)	mg/Kg	16
	3b502	Mangan (oxid (II) manganos)	mg/Kg	120
	3b603	Zinc (oxid de zinc)	mg/Kg	110
	3b203	Iod (iodat de calciu anhidru granulat învelit)	mg/Kg	1.25
	3b802	Seleniu (selenit de sodiu granulat învelit)	mg/Kg	0.3
Aditivi zootehnici				
Promotori de digestibilitate	4a1602i	Endo-1, 4-beta glucanază EC 3.2.1.4	U/kg	32
	4a1602i	Endo-1, 3-beta glucanază EC 3.2.1.6	U/kg	28
	4a1602i	Endo-1, 4-beta xilanază EC 3.2.1.8	U/kg	108
	4a18i	6 - Fitază (EC 3.1.3.26)	FYT/kg	1,000
Coccidiostatice și histomonostatice				
Coccidiostatic	5 1 701	Coxidin (monensin sodic)	mg/Kg	100
Aditivi tehnologici				
Antioxidanți	E321	BHT	mg/Kg	0.7
	E310	Propil galat	mg/Kg	0.06
Conservanți	1a330	Acid citric	mg/Kg	0.04
Antiaglomeranți	E551a	Acid silicic	mg/Kg	15.27
PRODUSUL NU CONTINE FĂINURI DE ORIGINE ANIMALĂ				

FURAJ COMPLET PENTRU PUI CREȘTERE/ FINISARE RURAL

Mod de utilizare: se administrează la puii de carne peste 30 zile, având apă la discreție.

Compoziție: făină de porumb, tărâță de grâu, șrot de floarea soarelui, gluten din porumb, soia(OMG*), orz, carbonat de calciu, ulei din floarea soarelui, fosfat monocalcic, sare.

Atenționări: A nu se amesteca cu alte coccidiostatice sau produse care conțin coccidiostatice! Periculos pentru cabaline. Acest furaj conține un ionofor: evitați administrarea simultană cu tiamulin și monitorizați eventualele reacții adverse atunci când este utilizat concomitent cu alte substanțe medicamentoase. Trebuie evitată utilizarea simultană cu apă de băut în care s-a adăugat clorură de colină. Utilizarea simultană a diferiților acizi organici sau a sărurilor acestora este contraindicată în cazul în care unul sau mai mulți dintre aceștia sunt utilizați într-o cantitate corespunzătoare conținutului maxim permis sau apropiată de acesta. **Interzis la rumegătoare.**

Perioada de așteptare la carne: a nu se folosi cu cel puțin 3 zile înainte de sacrificare.

A SE PĂSTRA LA LOC USCAT ȘI RĂCOROS.



Valori nutriționale		Umiditate	%	11.59
		Proteine brute	%	16
		Grăsimi brute	%	4.01
		Fibre brute	%	6.5
		Cenușă brută	%	9.19
		Fosfor	%	0.78
		Calciu	%	0.89
		Lizină	%	0.63
		Metionină	%	0.3
		Sodiu	%	0.16
Aditivi nutriționali				
Vitamine	3a672a	Vitamina A	UI/Kg	10000
	3a671	Vitamina D3	UI/Kg	4500
	3a700i	Vitamina E	mg/Kg	65
	3a711	Vitamina K (ca MNB)	mg/Kg	3
	3a821	Vitamina B1 (ca mononitrat de tiamină)	mg/Kg	2.5
	3a825ii	Vitamina B2	mg/Kg	6.5
	3a841	D-pantotenat de calciu	mg/Kg	18
	3a831	Vitamina B6	mg/Kg	3.2
	3a835	Vitamina B12	mg/Kg	0.017
	3a314	Niacina	mg/Kg	60
	3a316	Acid folic	mg/Kg	1.9
	3a880	Biotină	mg/Kg	0.18
	3a890	Clorură de colină	mg/Kg	200
	3a920	Betaină	mg/Kg	182.5
Minerale	3b103	Fier (Sulfat de fier (II) monohidrat)	mg/Kg	20
	3b405	Cupru (Sulfat de cupru (II) pentahidrat)	mg/Kg	16
	3b502	Mangan (oxid (II) manganos)	mg/Kg	120
	3b603	Zinc (oxid de zinc)	mg/Kg	110
	3b203	Iod (iodat de calciu anhidru granulat învelit)	mg/Kg	1.25
	3b802	Seleniu (selenit de sodiu granulat învelit)	mg/Kg	0.3
Aditivi zootehnici				
Promotori de digestibilitate	4a1602i	Endo-1, 4-beta glucanază EC 3.2.1.4	U/kg	32
	4a1602i	Endo-1, 3-beta glucanază EC 3.2.1.6	U/kg	28
	4a1602i	Endo-1, 4-beta xilanază EC 3.2.1.8	U/kg	108
	4a18i	6 - Fitază (EC 3.1.3.26)	FYT/kg	1000
Coccidiostatice și histomonostatice				
Coccidiostatic	5 1 701	Coxidin (monensin sodic)	mg/Kg	100
Aditivi tehnologici				
Antioxidanți	E321	BHT	mg/Kg	0.70
	E310	Propil galat	mg/Kg	0.06
Conservanți	1a330	Acid citric	mg/Kg	0.04
Antiaglomeranți	E551a	Acid silicic	mg/Kg	15.27

FURAJ COMPLET PENTRU PUI CURCĂ CREȘTERE RURAL

Mod de utilizare: se administrează la puii de curcă în perioada de creștere, având apă la discreție.

Compoziție: sorg, gluten din porumb, tărață de grâu, șrot de soia (OMG*), mălai din porumb, șrot de floarea soarelui, tărață de orez, germeni de porumb, carbonat de calciu, fosfat monocalcic, ulei vegetal, sare.

Atenționări: A nu se amesteca cu alte coccidiostatice sau produse care conțin coccidiostatice! Periculos pentru cabaline. Acest furaj conține un ionofor: evitați administrarea simultană cu tiamulin și monitorizați eventualele reacții adverse atunci când este utilizat concomitent cu alte substanțe medicamentoase. Trebuie evitată utilizarea simultană cu apă de băut în care s-a adăugat clorură de colină. Utilizarea simultană a diferiților acizi organici sau a sărurilor acestora este contraindicată în cazul în care unul sau mai mulți dintre aceștia sunt utilizați într-o cantitate corespunzătoare conținutului maxim permis sau apropiată de acesta. **Interzis la rumegătoare.**

Perioada de așteptare la carne: a nu se folosi cu cel puțin 3 zile înainte de sacrificare.

A SE PĂSTRA LA LOC USCAT ȘI RĂCOROS.



Valori nutriționale		Umiditate	%	12
		Proteine brute	%	20
		Grăsimi brute	%	4.4
		Fibre brute	%	8.3
		Cenușă brută	%	6.1
		Fosfor	%	0.46
		Calciu	%	1.25
		Lizină	%	0.95
		Metionină	%	0.45
		Sodiu	%	0.18
Aditivi nutriționali				
Vitamine	3a672a	Vitamina A	UI/Kg	10000
	3a671	Vitamina D3	UI/Kg	4500
	3a700i	Vitamina E	mg/Kg	65
	3a711	Vitamina K (ca MNB)	mg/Kg	3
	3a821	Vitamina B1 (ca mononitrat de tiamină)	mg/Kg	2.5
	3a825ii	Vitamina B2	mg/Kg	6.5
	3a841	D-pantotenat de calciu	mg/Kg	18
	3a831	Vitamina B6	mg/Kg	3.2
	3a835	Vitamina B12	mg/Kg	0.02
	3a314	Niacina	mg/Kg	60
	3a316	Acid folic	mg/Kg	1.9
	3a880	Biotină	mg/Kg	0.18
	3a890	Clorură de colină	mg/Kg	200
	3a920	Betaină	mg/Kg	182.5
Minerale	3b103	Fier (Sulfat de fier (II) monohidrat)	mg/Kg	20
	3b405	Cupru (Sulfat de cupru (II) pentahidrat)	mg/Kg	16
	3b502	Mangan (oxid (II) manganos)	mg/Kg	120
	3b603	Zinc (oxid de zinc)	mg/Kg	110
	3b203	Iod (iodat de calciu anhidru granulat învelit)	mg/Kg	1.25
	3b802	Seleniu (selenit de sodiu granulat învelit)	mg/Kg	0.3
Aditivi zootehnici				
Promotori de digestibilitate	4a1602i	Endo-1, 4-beta glucanază EC 3.2.1.4	U/kg	32
	4a1602i	Endo-1, 3-beta glucanază EC 3.2.1.6	U/kg	28
	4a1602i	Endo-1, 4-beta xilanază EC 3.2.1.8	U/kg	108
	4a18i	6 - Fitază (EC 3.1.3.26)	FYT/kg	1,000
Coccidiostatice și histomonostatice				
Coccidiostatic	5 1 701	Coxidin (monensin sodic)	mg/Kg	100
Aditivi tehnologici				
Antioxidanți	E321	BHT	mg/Kg	0.7
	E310	Propil galat	mg/Kg	0.06
Conservanți	1a330	Acid citric	mg/Kg	0.04
Antiaglomeranți	E551a	Acid silicic	mg/Kg	15.27
PRODUSUL NU CONȚINE FĂINURI DE ORIGINE ANIMALĂ				



VITALINE

Furaje Vitaline

Susțin creșterea naturală și sănătoasă
a animalelor de curte

BRIZURAT | **GRANULAT** | **FĂINOS**



Pui | Găini | Curci | Prepelițe | Rațe | Gâște | Porci | Iepuri



Producător:

SC FNC Nutriție Pietroiu SRL, București

Distribuitor:

SC FARMAVET SA

Calea Giulești, Nr 333, București

Tel : 021/221.99.60, Fax :021/220.69.32